Dossier Dysfonction mandibulaire (DTM)

Instabilité occlusale post ortho

JD.Orthlieb

Date :

Nom / N° de dossier : FLOW

femme Age : 48 ans

Motifs de consultation

Inconfort occlusal, dysesthésie occlusale

Historique :

- Orthodontie récente
- Erosions
- Légers troubles du sommeil

- Bruits : 0/10
- Algie : 0/10 (inconfort occlusal 6/10)
- Dysfonction : 0/10

Bilan dentaire : dents globalement saines, quelques restaurations postérieures

Muscles : difficultés de recrutement des muscles masséters en OIM (bons sur rouleaux de coton)

ATM : RAS

Douleur : absence de douleur objectivable

OIM

ORC

Occlusion :

- **calage** : insuffisance de calage postérieur
- **centrage** : décentrage sagittal net
- **guidage** : fonctions canines retardées, absence de GAR, classe 2 partielle

Hypothèses diagnostiques :

- Instabilité de l'OIM sans réel décentrage
- Bruxisme par crispations émotionnelles

Facteurs étiopathogéniques probables :

- Tensions émotionnelles
- Instabilité de l'OIM post orthodontique, légères érosions

Orientations thérapeutiques :

- PECC
- équilibration occlusale

Pourquoi une équilibration occlusale ? La stabilisation occlusale est :

- Simuler sur articulateur pour évaluer la faisabilité
- obtenue avec des moyens simples : Collage composite sur 16, 11, 13, 23, 24, 26 : calage et guidage (en particulier GAR)
- Expliquée comme un moyen de remise en confiance et de renforcement de la PECC
- En aucun cas, présentée comme le traitement étiologique des douleurs.

- réévaluation à 3, 6, 12 mois
- dentisterie restauratrice permanente sur dents postérieures