Nom / N° de dossier : SER

Homme Age : 51 ans

Motifs de consultation :

inconfort occlusal majeur, douleur sur 45 et remplacement des dents manquantes

Signes/symptômes

tensions temporo-massétérides le matin au réveil,
Troubles du sommeil et bruxisme

La 45 fracturée a été extraite en traitement initial

Pas de troubles musculo-articulaires, cinématique mandibulaire ample

Pas de problème de santé particulier

Bilan dentaire édentements postérieurs, reconstruction des secteurs postérieurs à envisager

- Bruits :** 0/10
- Algie :** 2/10 hors 45, inconfort occlusal 6/10
- Dysfonction :** 0/10

Cinématique mandibulaire

Muscles : muscles élévateurs denses

Occlusion :

- calage** : perte de calage postérieur
- centrage** : pas décentrage transversal
- guidage** : forte prématurité 17/47, fonction groupe

Hypothèses diagnostiques :

- DAM primaire musculaire
- perte de calage, forte prématurité par migration dentaire

Orientations thérapeutiques :

- Conseils comportementaux concernant le bruxisme, pas de gouttière
- Equilibration occlusale préprothétique : elle est indiquée en première intention, l'OIM résiduelle étant instable et décentrée.
- Sur l'articulateur, grâce au modèle fractionné, la simulation de l'équilibration occlusale montre que l'équilibration permet avec de très faible correction de retrouver des contacts antérieurs en Occlusion de Relation Centrée.

OIM = ORC après équilibration, le traitement prothétique peut maintenant être conduit.